

PromoBest



Bio estimulación

Líquido soluble

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE APLICACIÓN FOLIAR
PROMOTOR DE FLORACIÓN Y AMARRE DE FRUTO

¿POR QUÉ UTILIZAR PROMOBEST?

PromoBest es un regulador de crecimiento, que presenta un excelente balance de compuestos hormonales como Citocininas, Auxinas y Giberelinas especialmente diseñado para mejorar la inducción y diferencia floral.

PromoBest mantiene las hojas jóvenes y coloridas, potencializando la fotosíntesis, activa y robustece las raíces dando mayor soporte a la planta, mejora la viabilidad de las flores y la formulación de los frutos.

PromoBest aporta Fósforo y otros compuestos como el Zinc, Cobre, Boro, Magnesio y el Molibdeno, que favorece la floración, el amarre de frutos y asegura el buen desarrollo del fruto. Reduce las malformaciones de frutos y mantiene la sanidad en el cultivo.

BENEFICIOS


- Favorece el amarre de flores.
- Mejora la calidad de los frutos.
- Induce la formación de nuevos frutos.
- Equilibra la sanidad del cultivo.
- Mejora el amarre y la formación de los frutos.



más Resultados
al **menor** costo



agribest.com.mx





Composición garantizada	%
Citocininas	1000 ppm
Auxinas	1000 ppm
Giberelinas	1000 ppm
Aminoácidos	2.50%
Folcisteina	0.20%
Vitaminas	0.15%
Inositol	0.05%
Fósforo (P)	7.00%
Zinc (Zn)	3.60%
Potasio (K)	2.10%
Magnesio (Mg)	1.50%
Azufre (S)	1.00%
Boro (B)	1.00%
Calcio (Ca)	0.70%
Molibdeno (Mo)	0.40%
Agentes quelantes	3.00%
Diluyentes	76.50%
Total	100.00%

**PROPIEDADES
FISICOQUÍMICAS:**

Densidad (g/mL): 1.115 ; pH: 1.5 ± 0.05.



INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO(S)	ETAPA DE APLICACIÓN	DOSIS
Granos, cereales y forrajes.	Después de la emergencia.	0.5 - 1.0 L/ha
Hortalizas (de bulbo, raíz o tubérculo; brasicáceas, solanáceas, cucurbitáceas, de hoja).	En charolas o almácigos, plántula o posterior a trasplante o en inicios de floración.	0.5 - 1.0 L/ha
Frutales (de hueso, cítricos o pomáceas).	En desarrollo vegetativo.	0.5 - 1.0 L/ha
Leguminosas	En desarrollo vegetativo previo al llenado de vaina.	1.0 L/ha
Berries	En desarrollo vegetativo, previo al inicio de floración.	0.5 - 1.0 L/ha
Ornamentales	En desarrollo vegetativo.	1.0 L/ha
Caña de azúcar.	Desarrollo previo al amacollamiento.	1.0 - 2.0 L/ha
Cactáceas	En desarrollo vegetativo, previo al inicio de floración.	1.0 L/ha



MÉTODO PARA PREPARAR Y USAR EL PRODUCTO

Antes de abrir el envase, agite perfectamente el producto, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo los litros de agua limpia necesarios, agite y aplique inmediatamente.

Siempre calibre el equipo de aplicación.

Antes de realizar la mezcla se sugiere calibrar el pH del agua a 7.0.

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO

- Aplicación foliar.

Aplicar con mochila manual o motorizada, con boquilla de cono lleno.

Se recomienda en la aplicación asperjar hasta punto de goteo en el haz y envés de la hoja.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
- No se transporte o almacene junto con productos alimenticios o ropa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Lávese las manos después de utilizar el producto.
- Dispóngase de los envases vacíos conforme al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

Este producto es compatible con la mayoría de los agroquímicos. Sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar mezclas.

