AgriBest
GANAS TÚ, GANA EL PLANETA

FT-2026

BioHammer M

Bio protección

Líquido soluble

INSECTICIDA BIOLÓGICO ORGÁNICO DE APLICACIÓN FOLIAR
DE AMPLIO ESPECTRO, LETAL SOBRE LARVAS

¿POR QUÉ UTILIZAR BIOHAMMER M?

BioHammer M es un producto de origen biológico-botánico recomendado para el control de gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*), mosquita blanca (*Bemisia tabaci)* y palomilla dorso de diamante (*Plutella xylostella*).
BioHammer M contiene microorganismos entomopatógenos como la bacteria *Bacillus thuringiensis* que genera simultáneamente cristales y esporas con efecto tóxico al ser ingeridos por los insectos.

BioHammer M penetra en los insectos por acción del hongo *Beauveria bassiana*, degradando el tejido mediante la acción enzimática (proteasas, aminopeptidasas, lipasas y quitinasas), generando una septicemia en el insecto y provocando la muerte por una combinación de efectos que comprenden el daño físico de tejidos, toxicosis, deshidratación de las células por perdida de fluido y consumo de nutrientes.

BENEFICIOS

- Actúa como preventivo por su acción repelente.
- Coloniza y parasita rápidamente los insectos.
- Presenta diferentes modos de acción con alta efectividad.
- No daña a los insectos benéficos.
- Amplia gama de control de insectos en diferentes etapas del cultivo.

OMRI LISTED
Para Producción Orgánica
For Organic Use

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

bio Pro ducti Vidad SUSTENTABLE

más Resultados al menor costo

ESR Empresa Socialmente Responsable

Hecho en México

agribest.com.mx

AgriBest
GANAS TÚ, GANA EL PLANETA



Composición porcentual	%(P/V)
Beauveria bassiana (1x10^6 *UFC/mL*) Equivalente a 283.47 g. de i.a./L a 20°C	30.00%
Bacillus thuringiensis (1x10^6 *UFC/mL*) Equivalente a 94.49 g. de i.a./L a 20°C	10.00%
Diluyente	60.00%
Total	100.00%

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS: Densidad (g/mL): 0.95 ± 0.005; pH: 5.5 ± 0.5

INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Berenjena, Jitomate, Papa, Chile, Tomate Verde, Pimiento Morrón, Okra (0)	**Mosquita blanca (*Bemisia tabaci*)**	1.0-1.5	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 6 días cuando se detecten los primeros individuos plaga; volumen de aplicación sugerido 350-450 L de agua/ha.
Maíz, Sorgo (0)	**Gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*)**	1.0-1.2	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 6 días cuando se detecten los primeros individuos plaga; volumen de aplicación sugerido 350-450 L de agua/ha.
Brócoli, Col De Bruselas, Col, Coliflor, Mostaza, Colza, Colinabo (0)	**Palomilla dorso de diamante (*Plutella xylostella*)**	1.5-2.0	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros individuos plaga; volumen de aplicación sugerido 450-550 L de agua/ha.

( ) Intervalo de seguridad en día entre la última aplicación y cosecha, 0 días. SL sin limite
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: puede entrarse al cultivo tratado una vez que haya disminuido la humedad causada por la aplicación.

bio Pro ducti Vidad SUSTENTABLE

más Resultados al menor costo

ESR Empresa Socialmente Responsable · HECHO EN México

agribest.com.mx

MÉTODO PARA PREPARAR Y USAR EL PRODUCTO

Agite perfectamente el envase de BIOHAMMER M. Para abrir el envase, gire la tapa hasta romper el arillo de plástico, retire cuidadosamente el sello de seguridad, colocado en la parte superior del envase.

Agregue al tanque la mitad de agua requerida, mida con una probeta o con algún artículo graduado para este fin la cantidad de producto que se utilizará de acuerdo a la tabla de aplicaciones y adiciónelo al tanque de mezcla, agite constantemente mientras agrega el resto del agua. Es importante mantener la agitación de forma constante en el tanque para mantener una solución uniforme y homogénea.

Antes de realizar la mezcla se sugiere calibrar el pH del agua a un rango entre 5.0 - 5.5.

.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto
- No se transporte ni almacene junto con productos alimenticios, ropa o forrajes
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos
- Dispóngase de los envases vacíos conforme al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos.
- No almacene en casas habitación
- No use el producto sin el equipo de protección adecuado
- Los menores de 18 años no deben manejar este producto
- Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia
- No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel
- No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado.
- No destape la boquilla con la boca.

CONTRAINDICACIONES

- No aplicar en horas de calor intenso; cuando exista una alta probabilidad de lluvias, o cuando la velocidad del viento sea alta.

FITOTOXICIDAD

- BIOHAMMER M no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

- No se recomienda mezclar BIOHAMMER M con otros productos agroquímicos.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

- Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternando con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control

bio Productividad SUSTENTABLE
más Resultados al menor costo
ESR Empresa Socialmente Responsable
Hecho en México
agribest.com.mx